
Brzanka purpurowa (Barbus nigrofasciatus)

ODKRYWCA:RODZINA:WYSTĘPOWANIE:TEMPERATURA:pH \ dH:ROZMIAR:

Bleeker 1855 Cyprinidae

Sri Lanka

20-26oC6,0-7,0 \ do 15o6,5 cm

Ryba o bardzo ładnym ubarwieniu. Szczególnie imponująco wyglądają samce w czasie tarła. Głowa oraz kark ryb są wtedy intensywnie czerwono ubarwione. Jest to gatunek spokojny, ryba jest dość płochliwa. Najlepiej trzymać ją w stadzie kilku sztuk, boki akwarium obsadzamy roślinami by stworzyć rybom kryjówki. Brzanka purpurowa jest wszystkożerna, jej dietę powinno wzbogacać się o składniki roślinne, gatunek może podgryzać rośliny. Dymorfizm płciowy jest wyraźnie zaznaczony. Samce są większe i bardziej barwne. Do tarła należy przygotować zbiornik z miękką oraz lekko kwaśną wodą. Ryby trą się w gęstej roślinności rozrzucając ikrę. Po tarle należy odłowić tarlaki, gdyż zjedzą ikrę. Młode lęgną się po około 24 h. Pierwszym pokarmem powinien być świeży wylęg artemii.